

IT FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVAZIONE

Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente con vaporizzatori personali, sigarette elettroniche e dispositivi simili a norma CE che vaporizzano al prodotto, inserendo il liquido all'interno dell'apposito contenitore, che abbia un foro di riempimento di almeno 30 mm. Attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo utilizzato. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Conservare il liquido a temperature inferiori a 25°C e non esporlo alla luce diretta del sole. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alle disposizioni locali. L'uso del prodotto è sconsigliato ai giovani, ai minorenni e ai non fumatori.

CONTROINDICAZIONI E CASI IN CUI È SCONSIGLIATO L'USO DEL PRODOTTO

Si sconsiglia l'uso del prodotto nei seguenti casi:

- donne incinta, che sospettano di esserlo o programmano una gravidanza nel breve periodo o che stanno allattando
- persone che stanno assumendo nicotina attraverso altri dispositivi o presidi volti alla disassottigliamento da nicotina quali cerotti, sigarette, gomme da masticare
- persone in condizione di interdizione o incapaci di intendere e di volere in modo temporaneo o permanente

AVVERTENZE PER SPECIFICI GRUPPI A RISCHIO

Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto:

- se soffrite di malattie che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scompenso cardiaco o altre malattie cardiache, diabete, ipertensione, asma, malattie ai reni o al fegato, disturbi psichiatrici
- se soffrite di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, malattia da reflusso gastro-esofageo
- se siete allergici a uno o più componenti indicati in etichetta
- se siete assumendo farmaci che possono interagire con la nicotina
- se soffrite di patologie che a giudizio del vostro medico sconsigliano l'uso del prodotto
- se avete dubbi o incertezze sull'uso del prodotto

INFORMAZIONI SU EVENTUALI EFFETTI NOCIVI

Se il liquido viene a contatto con la pelle o con gli occhi lavare con abbondante acqua e contattare il medico qualora dovessero comparire fenomeni irritativi. Altri possibili effetti derivanti dal consumo di nicotina: tosse, mal di testa, irritazione della bocca e della gola, congestione nasale, ate ulcere, mal di gola, ansia, insonnia, depressione, malessere, nausea, bocca secca, bruciori di stomaco, dolori articolari, diarrea, meteorismo, allergia (eruzioni cutanee, mancanza di respiro, respiro difficoltoso, senso di oppressione al petto, gonfiore di faccia, lingua e labbra), sensazione di sete e singhiozzo, dolore toracico, febbre, battito cardiaco irregolare o accelerato, vertigini, sonnolenza. Possibili effetti da sovradosaggio: nausea, salivazione, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito, debolezza, palpitazioni.

CAPACITÀ DI INDURRE DIPENDENZA E

TOSSICITÀ Il prodotto può contenere nicotina in concentrazione variabile. Il contenuto di nicotina è riportato sull'etichetta. La nicotina è una sostanza altamente tossica che crea dipendenza.

RECAPITO DEL FABBRICANTE Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel. +39 0321960553 P.I.V. IT02068090030

IN CASO DI NECESSITÀ, CONTATTARE I RECAPITI TELEFONICI ATTIVI 24 ORE SU 24 DI ALCUNI CENTRI ANTIVELOE CAV "S.p.A. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma. Tel. 06 68593726; Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli. Tel. 0817472870; Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze. Tel. 055-7947819; Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano. Tel. 02-66101029

EN INFORMATIVE LEAFLET INSTRUCTION FOR USE AND STORAGE OF THE PRODUCT

The product can be used only in combination with personal vaping machine, electronic cigarettes and similar devices in compliance with CE marking by filling the e-liquid into the at least 3mm hole of the tank. Follow the device instructions provided by the manufacturer in the leaflet. Firmly close the bottle after the use. Keep the liquid in a place with temperatures below 25°C and store it away from direct sunlight. Do not use the product after the expiration date. Dispose of content/container in accordance with local laws. It is not recommended for use by young people, minors and non smokers.

CONTRA-INDICATIONS AND CASES WHERE IT IS NOT RECOMMENDED THE USE OF THE PRODUCT It's not recommended for use of:

- pregnant women, those who suspect they may be pregnant or plans to become pregnant in the near term or are breastfeeding
- people who are assuming nicotine through other devices or safeguards designed to detox from nicotine as plasters, pills, chewing gum
- people in interdiction condition or disabled and mentally incapacitated temporarily or permanently

WARNINGS FOR SPECIFIC GROUPS

Call your Doctor before using this product if:

- you have any medical condition which includes, but is not limited to, heart failure or other heart diseases, diabetes, high blood pressure, asthma, kidney or liver disease, psychiatric disorders
- you suffer from gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, gastro-esophageal reflux disease
- you are allergic to one or more label ingredients
- you are using any medication that may interact with nicotine

- you suffer from pre-existing disease that in the advice of your doctor may be a contraindication
- you have any doubt on the use of the product

INFORMATION ON POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

After skin/eye contact rinse with plenty of water and contact your doctor if irritation reactions appear. Other possible effects of the nicotine consumption are: coughing, headache, irritation of the mouth and throat, nasal congestion, aphthous ulcers, sore

throat, anxiety, insomnia, depression, discomfort, nausea, dry mouth, heartburn, aching joints, diarrhoea, allergy (skin - eruption), shortness of breath, laboured breath, tightness of the chest, swelling of the face, tongue and lips), feeling thirsty, hiccups, chest pain, fever, irregular or increased heart beat, dizziness, sleepiness. Possible adverse effects associated with overdose: nausea, salivation, abdominal pain, diarrhoea, sweating, headache, dizziness, hearing problems, weakness, palpitation.

ADDITIONENESS AND TOXICITY

This product may contain nicotine in variable concentration. The nicotine content is reported on the label. Nicotine is a highly toxic addictive substance.

CONTACT DETAILS Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel. +39 0321960553 VAT: IT02068090030

FR NOTICE - LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Le produit ne peut être utilisé qu'avec des vaporisateurs personnels, des cigarettes électroniques et des appareils similaires approuvés par la CE qui vaporisent le produit et pour lesquels le remplissage du réservoir s'effectue par un orifice d'au moins 3 mm. Respecter les instructions fournies par le producteur de l'appareil utilisé. Refermer soigneusement le flacon après usage. Conserver le liquide à une température inférieure à 25°C et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. Éliminer le contenu/récipient conformément aux indications locales. L'utilisation du produit est déconseillée aux jeunes, aux mineurs et aux non-fumeurs.

CONTRE-INDICATIONS ET CAS OÙ IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER LE PRODUIT

Il est déconseillé d'utiliser le produit dans les cas suivants:

- Femmes enceintes, qui pensent l'être ou qui programment une grossesse à court terme ou qui allaitent
- Personnes qui ingèrent de la nicotine à travers d'autres moyens ou appareils ayant pour but la désintoxication de la nicotine tels que, patches, cachets, chewing-gums
- Personnes en situation d'interdiction ou d'incapacité temporaire ou permanente

AVERTISSEMENTS POUR LES GROUPES À RISQUES SPÉCIFIQUES

Consultez le médecin avant d'utiliser le produit:

- Si vous souffrez d'une maladie telle que, à titre d'exemples non exhaustifs: insuffisance cardiaque ou autre maladie cardiaque, diabète, hypertension, asthme, maladie des reins ou du foie, troubles psychiatriques

- Si vous souffrez de gastrite, ulcère gastrique ou duodénal, reflux gastro-œsophagien
- Si vous êtes allergiques à un ou plusieurs composants indiqués sur l'étiquette

- Si vous prenez des médicaments qui peuvent interagir avec la nicotine
- Si vous souffrez de pathologies en présence desquelles l'utilisation du produit est déconseillée, selon l'avis de votre médecin
- En cas de doutes ou d'incertitudes sur l'utilisation du produit

EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Si le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter un médecin en cas d'irritations. Autres effets éventuels pouvant dériver de la consommation de nicotine: toux, maux de tête, irritation de la bouche et de la gorge, congestion nasale, aphtes ulcéreux, maux de gorge, angéisme, insomnie, dépression, malaise, nausée, bouche sèche, brûlures d'estomac, douleurs articulaires, diarrhées, météorisme, allergie (éruptions cutanées, manque de souffle, respiration difficile, sens d'oppression à la poitrine, visage, langue et lèvres gonflées), sensation de soif et longues et douleurs thoracique, fièvre, battements du cœur irréguliers ou accélérés, vertiges, somnolence. Éventuels effets de surdosage: nausée, salivation, douleurs abdominales, diarrhées, sueur, maux de tête, vertiges, troubles de l'ouïe, faiblesse, palpitations.

EFFET DE DÉPENDANCE ET TOXICITÉ

Le produit peut contenir de la nicotine en concentration variable. La teneur en nicotine est reportée sur l'étiquette. La nicotine est une substance très toxique qui entraîne une dépendance.

COORDONNÉES DU FABRICANT

Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel +39 0321960553 n°rta: IT02068090030

DE GEBRUCHSINFORMATION GEBRAUCHS- UND AUFBEWAHRUNGSANLEITUNG

Dieses Produkt ist eine alternative Methode für Raucher, um Nikotin zu konsumieren. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ausschließlich in Verbindung mit einer E-Zigarette oder einem anderen ähnlich benannten Produkt verwendet zu werden, dass die Flüssigkeit verdampft, um einen "rauchartigen" Nebel zu erzeugen. Das Produkt kann nur mit elektronischen Zigaretten und ähnlichen Geräten nach CE-Norm verwendet werden, indem die Flüssigkeit in den entsprechenden Behälter gefüllt wird, welcher ein Einfüllloch von mindestens 3 mm aufweist. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers des verwendeten Gerätes und achten Sie darauf, dass die Flasche nach Gebrauch gut geschlossen ist. Die Flüssigkeit sollte bei einer Temperatur von unter 25°C aufbewahrt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem Ablaufdatum. Der Inhalt/der Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf. Der Gebrauch durch Nichtraucher/innen wird nicht empfohlen!

GEGENANZEIGEN UND FÄLLE, IN DENEN

VON DER VERWENDUNG DES PRODUKTES ABGERATEN WIRD.

Die nachfolgend genannten Personen sollten das Produkt nicht verwenden:

- Frauen, bei denen bereits eine Schwangerschaft besteht, die vermuten, schwanger zu sein oder die kurzfristig eine Schwangerschaft planen oder stillen
- Personen, die Nikotin mittels anderer Geräte oder Hilfsmittel zu sich nehmen, die zur Nikotin-Entgiftung dienen, wie: Pflaster, Tabletten oder Kaugummis
- Personen, die vorübergehend oder dauerhaft einem Nikotin-Verbot unterstehen und/oder unfähig sind, dieses Verbot einzusehen oder dieses zu befolgen

WARNHINWEISE FÜR GEFÄHRDETE VERBRAUCHERGRUPPEN

Konsultieren Sie vor der Verwendung des Produktes Ihren Arzt:

- wenn Sie unter Krankheiten leiden, welche lediglich als Beispiel genannt - wie folgt beinhalten: Herzinsuffizienz oder andere Herzerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, Nieren- oder Lebererkrankungen, psychiatrische Störungen
- wenn Sie unter Gastritis, einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür oder einer gastro-ösophagealen Refluxkrankheit leiden
- wenn Sie allergisch auf eine oder mehrere Komponenten reagieren, die auf dem Etikett angegeben sind
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die mit Nikotin interagieren könnten
- wenn Sie an Krankheiten leiden, die nach Ansicht Ihres Arztes die Verwendung des Produkts unterbinden
- wenn Sie Zweifel oder Unsicherheiten hegen hinsichtlich der Verwendung des Produkts

ANGABE ZU MÖGLICHEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT.

Wenn die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, waschen Sie die entsprechende Stelle mit reichlich Wasser ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Reizungserscheinungen auftreten sollten. Weitere mögliche Auswirkungen des Nikotinkonsums sind: Husten, Kopfschmerzen, Reizungen von Mund und Rachen, nasale Kongestion, ulzerative Schmerzen, Haarschmerzen, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Depression, Unwohlsein, Übelkeit, trockener Mund, Schreinen, Gelenkschmerzen, Durchfall, Meteorismus (Blähbauch), Allergien (Hautausschlag, Kurzatmigkeit, Atemnot, Engpfehl in der Brust, Schwellung von Gesicht, Zunge und Lippen), Durstgefühl und Schluckauf, Brustschmerzen, Fieber, unregelmäßiger oder beschleunigter Herzschlag, Schwindel, Müdigkeit. Mögliche Folgen einer Überdosierung sind: Übelkeit, Speichelfluss, Bauchschmerzen, Durchfall, Schwinden, Kopfschmerzen, Schwindel, Hörstörungen, Schwäche, Herzklopfen.


ANGABE ZU SUCHTHERZEUGENDEN WIRKUNG UND ZU TOXIKOLOGISCHEN DATEN.

Das Produkt kann Nikotin in variabler Konzentration enthalten. Der Nikotingehalt ist auf dem Etikett entsprechend angegeben. Nikotin ist eine hochgiftige Substanz, die süchtig macht.

KONTAKANGABEN DES HERSTELLERS:


Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel +39 0321960553
UID: IT02068090030

A




Rimuovi il sigillo dalla boccetta
Remove the seal from the bottle
Oter le sceau du flacon
Entfernen Sie das Siegel
von dem Fläschchen

B



Premi il tappo e aprì la boccetta
Press the cap and open the bottle
Appuyer sur le bouchon
et ouvrir le flacon
Drücken Sie auf die Kappe und
öffnen Sie das Fläschchen

C



min. 3mm

Ricarica il tuo vaporizzatore seguendo
le indicazioni del produttore
Refill your vaporizer according to
the manufacturer's instruction
Rechargez votre cartouche selon les
indications fournies par le producteur
Laden Sie Ihre E-Zigarette gemäß
den Angaben des Herstellers auf